



Cirugía para Reducción de Peso

¿Qué procedimiento debo seleccionar?

MANGA GÁSTRICA



La cirugía se demora entre 1-2 hora



1-2 días en el hospita



Se reduce considerablemente la capacidad del estómago



Puede reanudar actividades rutinarias 3-5 semanas después

Este procedimiento limita la cantidad de alimentos que puede consumir al reducir quirúrgicamente un 80% del estomago. El 20% restante y la conexión al intestino permanecen intactos. No es necesario desviar la ruta alimenticia. Al igual que con el bypass gástrico, ayuda a producir una sensación de saciedad, suprime el apetito y puede mejorar los síntomas de la diabetes tipo 2.

No es reversible

Es necesario suplementar con vitaminas por el resto de su vida



Estimula una pérdida de peso rápida similar al bypass gástrico



Le permite seguir una dieta sin sentirse hambriento.



Reduce el apetito y aumenta la sensación de saciedad



No requiere la colocación de un dispositivo foráneo o la desviación de la ruta alimenticia



Estadía más corta en el hospital

BYPASS GÁSTRICO



La cirugía se demora entre 2-3 horas



2-3 o más días en el hospita



Se desconecta una mayor parte del estómago, pero permanece funcional



Puede reanudar actividades rutinarias 3-5 semanas después

Este procedimiento reduce la cantidad de alimentos que puede consumir al desconectar quirúrgicamente aproximadamente 85% de la ruta normal de absorción de alimentos. Se forma una bolsa de tamaño menor en la parte superior del estomago y se desvía directamente al intestino delgado. Ayuda a producir una sensación de saciedad, suprime el apetito y puede mejorar los síntomas de la diabetes tipo 2. Además, 95% de los pacientes experimentan una mejoría en la calidad de vida.

2-3 o más días en el hospita

Es necesario suplementar con vitaminas por el resto de su vida

Mayor riesgo de complicaciones debido a la naturaleza más compleja del procedimiento



Perdida a largo plazo de 60 - 80 % del exceso de peso



Le permite seguir una dieta sin sentirse hambriento



Reduce el apetito y le permite sentirse satisfecho



Alta tasa de efectividad



Se considera el estándar de rigor para las cirugías de reducción de peso